

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

**Информированное добровольное согласие на выполнение малоинвазивной манипуляции
КОРРЕКЦИЯ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПУТЕМ
ВВЕДЕНИЯ РАЗГРУЖАЮЩЕГО АКУШЕРСКОГО ПЕССАРИЯ**

" _____ " _____ 20 ____ г., " _____ "часов " _____ "минут

Настоящее добровольное согласие составлено в соответствии со статьями 20, 22, 52 Федерального закона от 21 ноября 2011г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Истмикоцервикальная недостаточность (ИЦН) - несостоятельность, некомпетентность шейки матки, укорочение шейки матки, расширение внутреннего зева, приводящие к разрыву плодного пузыря и потере беременности.

Акушерский разгружающий пессарий - это небольшое пластиковое или силиконовое медицинское изделие, которое вводится во влагалище для удержания матки в определенном положении. Акушерский пессарий применяется в акушерстве для профилактики преждевременных родов у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью (ИЦН) и для профилактики развития данной патологии. Эффективность этого метода коррекции ИЦН 85%. Пессарий акушерский разгружающий используется в ряде стран (Германия, Франция) более 30 лет, в странах СНГ (Россия, Беларусь, Украина) - более 18 лет.

Механизм действия акушерского разгружающего пессария основан на уменьшении нагрузки на шейку матки вследствие снижения давления плодного яйца.

Показания к применению акушерского разгружающего пессария:

- Функциональная и органическая истмико-цервикальная недостаточность.
- Профилактика истмико-цервикальной недостаточности у беременных в группе высокого риска развития ИЦН:
 - беременные, имеющие в анамнезе выкидыши в поздних сроках, преждевременные роды, страдающие привычным невынашиванием;
 - беременные с многоплодной беременностью;
 - беременные с рубцовой деформацией шейки матки;
 - генитальный инфантилизм, наступление беременности после продолжительного срока бесплодия, возрастные и юные беременные, женщины с нарушениями функции яичников;
 - беременные с угрозой невынашивания настоящей беременности, в сочетании с прогрессирующими изменениями шейки матки;
- Профилактика несостоятельности шва при хирургической коррекции ИЦН. Методика установки акушерского разгружающего пессария, не требует анестезии, легко переносится пациентками.

Я, _____
(ФИО пациентки, полностью)

внимательно прочла информацию об акушерском разгружающем пессарии и
_____ согласие на выполнение малоинвазивной манипуляции даю, не
даю - нужно вписать

